

**PART III: CONSUMER INFORMATION**

**Bi-PEGLYTE®  
Bowel Prep Kit**

Polyethylene Glycol 3350 and Electrolytes for Oral Solution USP and Bisacodyl Delayed Release Tablets USP

This leaflet is part III of a three-part «Prescribing Information» published when Bi-PEGLYTE® was approved for sale in Canada and is designed specifically for Consumers. This leaflet is a summary and will not tell you everything about Bi-PEGLYTE®. Contact your doctor or pharmacist if you have any questions about the drug.

**ABOUT THIS MEDICATION**

**What the medication is used for:**

Bi-PEGLYTE® is used for cleansing of the colon as a preparation for colonoscopy in adults.

**What it does:**

Bi-PEGLYTE® produces a watery stool which cleanses the bowel before colonoscopy examination. The bisacodyl component of Bi-PEGLYTE® acts as a stimulant laxative directly on the bowel to induce muscle contractions and to promote fluid accumulation in the bowel, and the polyethylene glycol binds to the water to help laxation and together the ingredients speed bowel emptying. The electrolytes help maintain the salt balance in this process.

**When it should not be used:**

- Do not use if you are hypersensitive (allergic) to any ingredient in this formulation (see “What the nonmedicinal ingredients are”).
- Do not take if you have any of the following stomach/intestine conditions (ask your doctor if you are unsure):
  - Ileus (blockage in the bowel)
  - Gastric retention (problems with food and fluid emptying from stomach)
  - Gastrointestinal (GI) obstruction (a blockage in bowel)
  - Bowel perforation (an opening in the wall of your stomach or intestine)
  - Toxic colitis (inflamed large bowel with damage to the intestinal wall)
  - Toxic megacolon (acute swelling of the large bowel)
  - Acute abdominal surgery
  - Appendicitis (painful swelling and infection of the appendix, a small pouch attached to the large intestine)
  - Rectal bleeding
  - Gastroenteritis (inflammation in the gastrointestinal tract)
  - Diverticulitis (a digestive disease found in the large intestine)

**What the medicinal ingredients are:**

Each sachet of PEG/Electrolytes powder gastrointestinal lavage preparation contains:

- Polyethylene Glycol 3350 ..... 59.55 g
- Sodium Sulphate ..... 5.74 g
- Sodium Bicarbonate ..... 1.69 g
- Sodium Chloride ..... 1.46 g
- Potassium Chloride ..... 0.76 g

Each blister-pack of Bisacodyl delayed release tablets, USP contains: three (3) tablets of bisacodyl 5 mg each.

**What the nonmedicinal ingredients are:**

**PEG/Electrolytes powder sachets** (in alphabetical order): Fruit flavour and Sodium Saccharin.

**Bisacodyl tablets** (in alphabetical order): D&C Yellow No.10 Aluminum Lake, FD&C Yellow No.6 Aluminum Lake, Glyceryl Stearate, Hypromellose, Lactose Monohydrate, Magnesium Stearate, Methylated Silica, Methylcellulose, Microcrystalline Cellulose, Polydextrose, Polydimethylsiloxane, Polyethylene Glycol, Polysorbate 65, Polyvinyl Acetate Phthalate, Silica, Sodium Alginate, Sodium Bicarbonate, Sodium Carboxymethylcellulose, Sorbic Acid, Stearic Acid, Sulphuric Acid, Talc, Titanium Dioxide, Triacetin, Triethyl Citrate.

**What dosage forms it comes in:**

Bi-PEGLYTE® is a kit containing two sachets of PEG/Electrolytes powder for reconstitution (each sachet is dissolved into 1 L of water – see “Proper use of this Medication”) and one blister-pack containing 3 tablets of 5 mg each of bisacodyl. The entire contents of the kit should be used for the product to be effective.

**WARNINGS AND PRECAUTIONS**

**BEFORE you use Bi-PEGLYTE® talk to your doctor or pharmacist if:**

- You have taken any other medication within two hours of when you plan to start the PEG/Electrolyte solution (you may be removing this medication from your gastrointestinal tract by taking the PEG/Electrolyte solution)
- You have abdominal pain, nausea, or vomiting
- You have a history of electrolyte imbalance (e.g., change in blood salts (low blood sodium)) or are using diuretics
- You have ulcerative colitis or any other inflammatory bowel disease (e.g., Crohn’s disease)
- You are pregnant or nursing
- You have difficulty swallowing or have a pronounced gag reflex or are prone to vomiting
- You have any allergies to this drug or its ingredients
- In rare cases, serious heart arrhythmias (an irregular or fast heartbeat) have been associated with the use of medicines such as Bi-PEGLYTE®. Tell your doctor if you have problems with your heart such as:
  - a history of an abnormal electrical signal called “prolongation of the QT interval”
  - an arrhythmia that is not under control
  - a recent heart attack
  - heart failure
  - cardiomyopathy (a disease of the heart muscle that makes it harder for your heart to pump blood to the rest of your body)

Your doctor will decide whether you can take Bi-PEGLYTE®. Talk to your doctor if you have kidney or heart problems or any tendency to regurgitate (bring up) food from your stomach into your esophagus or any tendency to accidentally inhale food or regurgitate food into the airways.

Bi-PEGLYTE® contains polyethylene glycol (PEG), which may stop starch based food thickeners from working. This may cause certain mixtures to be watery and difficult to swallow.

**Inform your doctor immediately if you experience severe abdominal pain or rectal bleeding.**

**INTERACTIONS WITH THIS MEDICATION**

Oral medications taken within 2 hours of the start of administration of the PEG/Electrolytes powder may be flushed from the gastrointestinal tract and not absorbed.

Tell your doctor and pharmacist about all the medicines you are taking, including prescription and non-prescription medications, vitamins, nutritional supplements, and herbal products.

Bi-PEGLYTE® may interact with stimulant laxatives (e.g. bisacodyl). Stop taking Bi-PEGLYTE® and seek medical help if you experience severe abdominal pain and / or rectal bleeding.

**PROPER USE OF THIS MEDICATION**

On the day before the procedure no solid foods or milk, except clear liquids, should be taken after 11h00 AM or as specified by your doctor. You can resume eating solid foods and milk only after your procedure or examination. No antacids should be taken within one hour of taking the bisacodyl tablets. Your physician will tell you what time of the day to start your treatment.

Drink plenty of water (or clear liquids) before, during and after using Bi-PEGLYTE®.

You should have been given specific instructions about when to take Bi-PEGLYTE® by your doctor or nurse. Your treatment with Bi-PEGLYTE® must be completed before your clinical procedure.

**Preparation of the solution:**

1. Dissolve the entire contents of one sachet in 1 L (32 ounces) of lukewarm water and mix rapidly until a clear solution forms. Do not use cold water. **Repeat the step with the second sachet.** Do not add any other ingredients (e.g. flavouring, juice) to the solution.



2. Refrigerate the solution as chilling improves the taste. Using a straw may help the solution taste better and easier to drink.



3. Use the freshly-made solution within 48 hours and discard unused portion.



**Dosing regimens your healthcare practitioner may prescribe:**


**SPLIT-DOSING REGIMEN\***

**Day before procedure:\*\***

1. Take 3 bisacodyl tablets (total of 15 mg) with water in the afternoon (at around 2:00 PM)\*\*. **Do not chew or crush the tablets.**



2. In the evening (at around 8:00 PM or 6 hours after taking the bisacodyl tablets)\*\*, rapidly drink a glassful (250 mL) of the PEG/Electrolytes solution every 10 minutes until the 1 litre solution is finished.



**Day of the procedure (about 4 hours before the procedure):\*\***

3. Take the second PEG/Electrolytes solution and rapidly drink a glassful (250 mL) of the solution every 10 minutes until the 1 litre solution is finished, or as directed by a physician.




**FULL-DOSING REGIMEN\***

**Day before procedure (start in the afternoon):\*\***

1. Take 3 bisacodyl tablets (total of 15 mg) with water. **Do not chew or crush the tablets.**



2. Wait for a bowel movement (or maximum of 6 hours).



3. After a bowel movement, or if there is no bowel movement within 6 hours of taking the Bisacodyl tablets, rapidly drink a glassful (250 mL) of the PEG/Electrolytes solution every 10 minutes until the 1 litre solution is finished.



4. Take the second PEG/Electrolytes solution and rapidly drink a glassful (250 mL) of the solution every 10 minutes until the 1 litre solution is finished or as directed by a physician.



\*Follow instructions as prescribed by your physician. Your physician may choose to prescribe a full-dosing or a split-dosing regimen. \*\*Time to be confirmed by your physician. You will begin to have watery bowel movements within 1 hour after the start of PEG/Electrolytes administration and you will continue to have loose bowel movements for 1 to 2 hours after finishing the solution. Lavage is complete when the watery stool is clear and free of solid matter.

**Make sure to take the entire bowel preparation solution as instructed by your doctor.** This will help ensure that the colon will be optimally cleaned and minimize the need to reschedule your procedure.

Abdominal bloating or distention may occur before the first bowel movement. If your abdominal distention or discomfort continues, stop drinking the PEG/Electrolyte solution temporarily or drink each portion at longer intervals until your symptoms disappear. If you experience severe bloating, distention or abdominal pain, administration of the solution should be slowed or temporarily discontinued until the symptoms subside. Report these events to your doctor. **Inform your doctor immediately if you experience severe abdominal pain or rectal bleeding.**

**Overdose:**

If you think you, or a person you are caring for, have taken too much Bi-PEGLYTE®, contact a healthcare professional, hospital emergency department, or regional poison control centre immediately, even if there are no symptoms.

**SIDE EFFECTS AND WHAT TO DO ABOUT THEM**

Nausea, abdominal fullness and bloating are the most frequent side effects occurring in up to half of patients taking PEG/Electrolytes preparations. Abdominal cramps, vomiting and anal irritation occur less frequently. These side effects normally do not last long. Mild cramping has occurred in some patients after bisacodyl administration.

Bi-PEGLYTE® may cause loss of body fluid (dehydration) and changes in blood salts (electrolytes) in your blood. These changes may cause:

- seizures
- kidney problems
- abnormal heartbeats

Drink sufficient amount of balance salt-containing fluid as directed by your doctor to prevent loss of body fluid and related side-effects.

**SERIOUS SIDE EFFECTS, HOW OFTEN THEY HAPPEN AND WHAT TO DO ABOUT THEM**

Symptom / effect	Talk to your healthcare professional		Stop taking drug and get immediate medical help
	Only if severe	In all cases	
Unknown Ischemic colitis (lack of blood flow to intestines): severe abdominal pain, rectal bleeding			✓
Isolated Cases Allergic reactions with symptoms such as skin rash, hives and runny nose			✓

**This is not a complete list of side effects. For any unexpected effects while taking Bi-PEGLYTE®, contact your healthcare professional.**

**HOW TO STORE IT**

Store the contents of the Bi-PEGLYTE® carton at room temperature (15-30°C). The freshly-reconstituted PEG/Electrolyte solution should be used within 48 hours if stored at room temperature. Discard unused portion. Keep out of reach and sight of children.

**Reporting Side Effects**

You can report any suspected side effects associated with the use of health products to Health Canada by:

- Visiting the Web page on Adverse Reaction Reporting (<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada.html>) for information on how to report online, by mail or by fax; or
- Call toll-free at 1-866-234-2345.

*NOTE: Contact your health professional if you need information about how to manage your side effects. The Canada Vigilance Program does not provide medical advice.*

**MORE INFORMATION**

- Talk to your healthcare professional.
- Find the full product monograph that is prepared for healthcare professionals and includes this Patient Medication Information by visiting the Health Canada website: (<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/drug-product-database.html>); the manufacturer’s website [www.pendopharm.com](http://www.pendopharm.com) or by calling 1-888-550-6060.

This leaflet was prepared by Pendopharm, division of Pharmascience Inc.

Last Revised: May 4, 2023

®Registered trademark of Pharmascience Inc.



**PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR**  
**Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup>**

**Trousse de préparation intestinale**

Polyéthylène glycol 3350 et électrolytes pour solution orale USP et comprimés de bisacodyl à libération retardée USP

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de l'information posologique publiée à la suite de l'approbation de la vente au Canada de Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup>. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

**AU SUJET DE CE MÉDICAMENT**

**Les raisons d'utiliser ce médicament :**

Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> est utilisé pour le nettoyage du côlon dans le cadre de la préparation pour une coloscopie chez les adultes.

**Les effets de ce médicament :**

Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> produit des selles aqueuses qui nettoient l'intestin avant l'examen coloscopique. La composante bisacodyl de Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> est un laxatif stimulant de contact, qui agit directement sur l'intestin en induisant des contractions musculaires pour favoriser l'accumulation des liquides dans l'intestin. Le polyéthylène glycol se lie à l'eau pour faciliter l'effet laxatif. Ensemble, ces ingrédients accélèrent l'évacuation de l'intestin. Les électrolytes contribuent au maintien de l'équilibre des sels durant le processus.

**Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :**

Ne pas utiliser si vous êtes hypersensible (allergique) à tout ingrédient qui entre dans cette formulation (voir la section **Les ingrédients non médicinaux** sont).

Ne pas utiliser si vous avez l'une ou l'autre des conditions de l'estomac ou de l'intestin suivantes (demander à votre médecin si vous n'êtes pas sûr) :

- Iléus (blocage de l'intestin)
- Rétention gastrique (problèmes reliés à l'évacuation de la nourriture et des fluides de l'estomac)
- Obstruction gastro-intestinale (GI) (un blocage de l'intestin)
- Perforation intestinale (une ouverture dans la paroi de votre estomac ou de votre intestin)
- Colite toxique (inflammation du gros intestin avec des dommages aux parois de l'intestin)
- Colectasie (dilatation aiguë du côlon)
- Chirurgie aiguë de l'abdomen
- Appendicite (gonflement douloureux et infection de l'appendice, une petite poche attachée au gros intestin)
- Saignement rectal
- Gastroentérite (inflammation du tractus gastro-intestinal)
- Diverticulite (maladie digestive située au niveau du gros intestin)

**Les ingrédients médicinaux sont :**

Chaque sachet de préparation en poudre de PEG/électrolytes pour le lavage gastro-intestinal contient :

- Polyéthylène glycol 3350..... 59,55 g
- Sulfate de sodium ..... 5,74 g
- Bicarbonate de sodium..... 1,69 g
- Chlorure de sodium..... 1,46 g
- Chlorure de potassium ..... 0,76 g

Chaque plaquette alvéolée de comprimés de bisacodyl à libération retardée USP contient : trois (3) comprimés de 5 mg de bisacodyl chacun.

**Les ingrédients non médicinaux sont :**

**Sachet de poudre de PEG/électrolytes** (ordre alphabétique) : Saccharine sodique et saveurs de fruit.

**Comprimés de bisacodyl** (ordre alphabétique) : acétophthalate de poly(vinyle), acide sorbique, acide stéarique, acide sulfurique, alginate de sodium, bicarbonate de sodium, carboxyméthylcellulose de sodium, cellulose microcristalline, citrate d'éthyle, D&C jaune n°10 sur substrat d'aluminium, dioxyde de titane, FD&C jaune n°6 sur substrat d'aluminium, hypromellose, lactose monohydraté, méthylcellulose, polydextrose, polydiméthylsiloxane, polyéthylène glycol, polysorbate 65, silice, silice méthylée, stéarate de glycéril, stéarate de magnésium, talc, triacétine.

**Les formes posologiques sont :**

Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> est une trousse contenant deux sachets de poudre PEG/électrolytes pour la reconstitution (chaque sachet doit être dissout dans 1L d'eau – voir la section *Utilisation appropriée de ce médicament*) et une plaquette alvéolée contenant 3 comprimés de 5 mg de bisacodyl chacun. L'ensemble du contenu de la trousse doit être utilisé pour que le produit soit efficace.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

**Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d'utiliser Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> :**

- Vous avez pris d'autres médicaments dans les 2 heures avant le moment où vous prévoyez commencer à prendre la solution PEG/électrolytes (vous pourriez éliminer ces médicaments de votre tractus gastro-intestinal en prenant la solution PEG/électrolytes)
- Vous souffrez de douleurs abdominales, de nausées ou de vomissements
- Vous avez des antécédents de déséquilibre électrolytique (par ex., changement dans les sels sanguins (sodium sanguin faible)) ou utilisez des diurétiques
- Vous avez des colites ulcéreuses ou d'autres maladies inflammatoires de l'intestin (par ex., maladie de Crohn)
- Vous êtes enceinte ou allaité
- Vous avez de la difficulté à avaler ou avec un réflexe pharyngé très fort ou êtes sujet au vomissement
- Vous souffrez d'allergies à ce médicament ou à un ou l'autre de ses ingrédients
- Dans de rares cas, de graves arythmies cardiaques (un rythme cardiaque irrégulier ou rapide) ont été associées à l'utilisation de médicaments tels que Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup>. Dites à votre médecin si vous avez des problèmes avec votre cœur tels que :
  - une histoire d'un signal électrique anormal appelé «prolongation de l'intervalle QT»
  - une arythmie qui n'est pas sous contrôle
  - une crise cardiaque récente
  - une insuffisance cardiaque
  - une cardiomyopathie (une maladie du muscle cardiaque qui rend plus difficile pour votre cœur de pomper le sang au reste de votre corps)

Votre médecin décidera si vous pouvez prendre Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup>.

Parlez à votre médecin si vous avez des problèmes de rein ou de cœur ou une tendance à régurgiter (remonter) la nourriture de votre estomac dans votre œsophage ou toute tendance à accidentellement inhaler de la nourriture ou régurgiter de la nourriture dans les voies respiratoires. Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> contient du polyéthylène glycol (PEG) qui empêche l'effet épaississant de la base de l'amidon alimentaire. Cela peut provoquer certains mélanges aqueux difficile à avaler.

**Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez de fortes douleurs abdominales ou des saignements au niveau du rectum.**

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les médicaments pris par voie orale dans les 2 heures avant le début de l'administration de la poudre PEG/électrolytes pourraient être éliminés du tractus gastro-intestinal et donc ne pas être absorbés. Informez votre médecin ou votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez, incluant les produits de prescription et en vente libre, vitamines, suppléments nutritionnels et produits naturels. Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> peut interagir avec des laxatifs stimulants (par exemple bisacodyl). Arrêtez de prendre Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> et consultez de l'aide médicale si vous ressentez des douleurs abdominales sévères et / ou des saignements rectaux.

**UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT**

Le jour avant de la procédure, aucuns aliments solides ni lait (à l'exception de liquides clairs) ne doivent être consommés après 11h00 AM ou tel que spécifié par votre médecin. Les aliments solides et le lait peuvent être réintroduits seulement après l'examen ou la procédure. Aucun antiacide ne devrait être pris dans l'heure précédant ou suivant la prise des comprimés de bisacodyl. Votre médecin vous indiquera à quel moment la journée de commencer votre traitement.

Boire beaucoup d'eau (ou de liquides) avant, pendant et après l'utilisation de Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup>.

Vous devriez avoir reçu des instructions spécifiques de la part de votre médecin ou infirmière à propos de quand prendre Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup>. Votre traitement avec Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> doit être complété avant la procédure clinique.

**Préparation de la solution :**


1. Dissoudre le contenu entier d'un sachet dans 1 L (32 onces) d'eau tiède et mélanger rapidement jusqu'à l'obtention d'une solution claire. Ne pas utiliser d'eau froide. **Répéter cette étape avec le second sachet.** N'ajoutez aucun ingrédient additionnel (p.ex. un saveur, du jus) à la solution.



2. Réfrigérer la solution puisque le refroidissement améliore le goût. L'utilisation d'une paille peut aider à rendre la solution plus agréable au goût et facile à boire.



3. La solution fraîchement préparée doit être utilisée dans les 48 heures. Jetez toute quantité inutilisée.



**Schémas posologiques que votre praticien en soins de santé peut prescrire :**

**SCHÉMA DOSE FRACTIONNÉE\***

**Jour avant la procédure :\*\***

1. Prendre 3 comprimés de bisacodyl (total de 15 mg) avec de l'eau dans l'après-midi (aux environs de 14:00 PM)\*\*. **Ne pas croquer ou écraser les comprimés.**



2. Dans la soirée (aux environs de 20:00 PM ou 6 heures après avoir pris les comprimés de bisacodyl)\*\*; boire rapidement un verre (250 mL) de solution PEG/Électrolytes chaque 10 minutes jusqu'à ce que le 1 litre soit consommé.



**Jour de la procédure (environ 4 heures avant la procédure) :\*\***

3. Prendre le second litre de solution PEG/Électrolytes et boire rapidement un verre (250 mL) de solution chaque 10 minutes jusqu'à ce que le 1 litre soit consommé, ou tel que spécifié par le médecin.



**SCHÉMA DOSE COMPLÈTE\***

**Jour avant la procédure (débuter dans l'après-midi) :\*\***

1. Prendre 3 comprimés de bisacodyl (total de 15 mg) avec de l'eau. **Ne pas croquer ou écraser les comprimés.**



2. Attendre d'aller à la selle (ou un maximum de 6 heures).



3. Après une selle, ou s'il n'y a pas de selle 6 heures après avoir pris les comprimés de bisacodyl, boire rapidement un verre (250 mL) de solution PEG/électrolytes à chaque 10 minutes jusqu'à ce que le 1 litre de solution soit consommé.



4. Prendre le second litre de solution PEG/Électrolytes et boire rapidement un verre (250 mL) de solution à chaque 10 minutes jusqu'à ce que le 1 litre de solution soit consommé ou tel qu'indiqué par le médecin.



\* Suivez les instructions tel que prescrit par le médecin. Les médecins peuvent choisir de prescrire un schéma posologique dose complète ou dose fractionnée. \*\* Temps à être confirmé par le médecin.

Vous allez excréter des selles aqueuses dans l'heure qui suit le début de l'administration de la solution de PEG/électrolytes et continuerez d'excréter des selles molles pendant 1 à 2 heures après avoir terminé de boire la solution. Le lavage est terminé lorsque les selles aqueuses sont incolores et sans matières solides.

**Veillez-vous assurer de prendre entièrement la solution de préparation tel qu'indiqué par votre médecin.** Ceci aidera à s'assurer que le côlon est nettoyé de façon optimale et minimisera le besoin de reculer votre procédure.

Des ballonnements ou de la distension au niveau de l'abdomen peuvent se produire avant les premières selles. Si l'inconfort ou la distension abdominale continue, arrêtez de boire temporairement la solution PEG/électrolytes ou prenez plus de temps pour boire chaque portion jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent. Si vous ressentez des ballonnements, de la distension ou des douleurs abdominales graves, il faut ralentir l'administration de la solution ou l'interrompre temporairement jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Signalez ces effets à votre médecin.

**Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez de fortes douleurs abdominales ou des saignements au niveau du rectum.**

**Surdose :**

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup>, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

**PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES**

Les nausées, l'impression de plénitude abdominale et les ballonnements sont les effets indésirables les plus fréquents affectant jusqu'à la moitié des patients prenant des préparations de PEG/électrolytes. Les crampes abdominales, les vomissements et l'irritation anale se produisent moins souvent. Ces effets secondaires sont habituellement de courte durée. De légères crampes ont été ressenties par certains patients après l'administration de bisacodyl.

Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> peut causer des pertes de fluides corporels (déshydratation) et des changements au niveau des sels sanguins (électrolytes dans votre sang). Ces changements peuvent causer des :

- convulsions
- problèmes rénaux
- battements cardiaques anormaux

Buvez une quantité suffisante de fluides équilibrés en sels selon les recommandations de votre médecin pour prévenir la perte de fluides corporels et les effets secondaires reliés.

**EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE**

Symptôme/effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
Inconnu Colite ischémique (faible flux sanguine vers les intestins); douleur abdominale sévère, saignements rectaux			✓
Cas isolés Réaction allergiques avec symptômes, tel que irritation cutanée, nez qui coule, inflammation cutanée			✓

**Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise de Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup>, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.**

**COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Conservez Bi-PEGLYTE<sup>MD</sup> à température ambiante (15 °C à 30 °C) dans l'emballage de carton. La solution fraîchement reconstituée de PEG/électrolytes doit être utilisée dans les 48 heures si elle est gardée à la température ambiante. Jetez toute quantité inutilisée. Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

**Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur ; ou
- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

**REMARQUE :** Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant [www.pendopharm.com](http://www.pendopharm.com), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-550-6060.

Le présent dépliant a été rédigé par PENDOPHARM, division de Pharmascience inc.

Dernière révision : 4 mai 2023

<sup>MD</sup>Marque de commerce déposée de Pharmascience inc.



43346  
Noir OUVRE 155 mm x 536 mm